

VARIABLES DE RISQUE

Veillez compléter les informations suivantes dans le but de calculer le risque global de fracture suivant l'algorithme FRAX

L'âge: ans

Le poids: kg

La taille: cm

Le sexe: M F

Antécédents de fractures: oui non

Fractures de la hanche dans la famille jusqu'au second degré: oui non

Tabagisme: oui non

Utilisation de corticoïdes: oui non

Arthrite rhumatoïde: oui non

Ostéoporose secondaire: oui non

Utilisation de plus de 3 unités d'alcool par jour: oui non

INFORMATION CLINIQUE:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LE MÉDECIN SOLLICITANT

(Cachet + Signature)

DATE:/...../.....

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DENSITOMÉTRIE OSSEUSE

DONNÉES DU PATIENT OU VIGNETTE D'IDENTIFICATION

Nom et prénom:

Adresse:

.....

.....

Numéro d'hospitalisation:

Code unique d'identification:.....

En mouvement

Assis

Couché

Ambulant

Hospitalisé

Chambre:

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT (veuillez cocher)

L'examen est remboursé chez les patients suivants (l'examen peut être renouvelé après cinq ans, selon les mêmes règles d'application):

- 1/ femmes de plus de 65 ans ayant des antécédents familiaux d'ostéoporose à savoir une fracture de la hanche chez un membre de la famille au premier ou au deuxième degré;

2/ quel que soit l'âge ou le sexe si au moins un des facteurs de risque suivants est présent:

- a/ fracture low impact non oncologique de la colonne;
- b/ antécédents de fracture low impact périphérique à l'exclusion d'une fracture au niveau des doigts, des orteils, du crâne, de la face ou de la colonne vertébrale cervicale;
- c/ patients présentant une corticothérapie prescrite de plus de trois mois consécutive à un équivalent de >7,5 mg prednisolone/jour;
- d/ patients oncologiques sous thérapie anti-hormonale ou en ménopause à la suite d'une thérapie oncologique;
- e/ patients atteints au moins d'une des affections à risque suivantes:
- 1° arthrite rhumatoïde;
- 2° hyperthyroïdie évolutive non traitée;
- 3° hyperprolactinémie;
- 4° hypogonadisme de longue durée (y compris orchidectomie thérapeutique ou traitement de longue durée par "gonadotrophinereleasing-hormone" (GnRH) analogue);
- 5° hypercalciurie rénale;
- 6° hyperparathyroïdie primaire;
- 7° osteogenesis imperfecta;
- 8° Maladie/Syndrome de Cushing;
- 9° anorexia nervosa avec Body Mass Index <19 kg/m²;
- 10° ménopause précoce (<45 ans).

- L'examen n'est pas remboursé

Variables de risque clinique (dans le but de calculer le FRAX): voir verso